Informació per a pacients amb malaltia tromboembòlica

Tractament amb anticoagulants orals d'acció directa.

Objectiu del tractament:

– Prevenir trombosis i embòlia en pacients que ja les han sofert.

Característiques dels anticoagulants:

– Redueixen el risc que es formin coàguls de sang.
– Inconvenient principal: augment del risc d'hemorràgies.
– Risc més alt d'hemorràgies en pacients majors de 75 anys, amb problemes de ronyó o úlceres d'estómac, o que prenen altres medicaments que poden interferir amb la coagulació de la sang.

Precaucions abans de començar el tractament:

– Informar al metge si es tenen problemes de ronyó, hemorràgies prèvies, úlceres d'estómac o si es vol quedar embarassada.
– Evitar anticoagulants si hi ha una alteració de la sang que provoca tendència hemorràgica.

Com prendre els anticoagulants:

– Seguir les indicacions del metge.
– Tractament amb Pradaxa o Eliquis: 2 cops al dia; Xarelto o Lixiana: 1 cop al dia (amb excepcions).
– Prendre amb àpats o sense, les càpsules s'han d'empassar senceres.
– En cas d'oblit de dosis, seguir les instruccions específiques segons el medicament.
– No abandonar el tractament sense consultar amb el metge.

Interferències amb altres medicaments:

– Medicaments que poden augmentar el risc d'hemorràgia: aspirina, antiinflamatoris, clopidogrel, heparina.
– No es poden prendre altres anticoagulants (Sintrom, Aldocumar, heparines) juntament amb Pradaxa, Xarelto, Eliquis o Lixiana.
– Consultar sempre el metge abans de començar nous tractaments.

HUB 984 / 10-2025

Informació per pacients amb malaltia tromboembòlica

Complicacions i símptomes a tenir en compte:

– Petites hemorràgies: sagnat lleuger, blaus, menstruació abundant.
– Hemorràgies importants: sagnat espontani o després d'un cop, múltiples blaus grans.
– Símptomes greus: deposicions negres (indici d'hemorràgia digestiva), sang a la femta, vòmits amb sang, tos amb sang, dolor a les articulacions, mal de cap intens, dificultat per parlar, pèrdua de força.
– En cas d'un traumatisme important, comunicar que es pren anticoagulant.

Altres efectes secundaris:

– Reaccions al·lèrgiques: erupció cutània, dificultat per respirar, opressió al pit.
– Cremor d'estómac.

Precaucions especials:

– Informar al metge abans de qualsevol intervenció quirúrgica.
– En extraccions dentals, seguir les recomanacions per evitar complicacions hemorràgiques.