

Información para pacientes con enfermedad tromboembólica

Tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa.

Objetivo del tratamiento:

- Prevenir trombosis y embolia en pacientes que ya las han sufrido.

Características de los anticoagulantes:

- Reducen el riesgo de que se formen coágulos de sangre.
- Inconveniente principal: aumento del riesgo de hemorragias.
- Riesgo más alto de hemorragias en pacientes mayores de 75 años, con problemas de riñón o úlceras de estómago, o que tomen otros medicamentos que puedan interferir con la coagulación de la sangre.

Precauciones antes de empezar el tratamiento:

- Informar al médico si se tienen problemas de riñón, hemorragias previas, úlceras de estómago o si se quiere quedar embarazada.
- Evitar anticoagulantes si hay una alteración de la sangre que provoca tendencia hemorrágica.

Cómo tomar los anticoagulantes:

- Seguir las indicaciones del médico.
- Tratamiento con Pradaxa o Eliquis: 2 veces al día; Xarelto o Lixiana: 1 vez al día (con excepciones).
- Tomar con o sin comidas, las cápsulas se han de tragar enteras.
- En caso de olvidarse la dosis, seguir las instrucciones específicas según el medicamento.
- No abandonar el tratamiento sin consultar con el médico.

Interferencias con otros medicamentos:

- Medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hemorragia: aspirina, antiinflamatorios, clopidogrel, heparina.
- No se pueden tomar otros anticoagulantes (Sintrom, Aldocumar, heparinas) junto con Pradaxa, Xarelto, Eliquis o Lixiana.
- Consultar siempre con el médico antes de iniciar nuevos tratamientos.

Información para pacientes con enfermedad tromboembólica

Complicaciones y síntomas a tener en cuenta:

- Pequeñas hemorragias: sangrado ligero, hematomas, menstruación abundante.
- Hemorragias importantes: sangrado espontáneo o después de un golpe, múltiples hematomas grandes.
- Síntomas graves: deposiciones negras (inicio de hemorragias digestivas), sangre en las heces, vómitos con sangre, tos con sangre, dolor en articulaciones, dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar, pérdida de fuerza.
- En caso de un traumatismo importante, comunicar que se toma anticoagulante.

Otros efectos secundarios:

- Reacciones alérgicas: erupción cutánea, dificultad para respirar, opresión en el pecho.
- Ardor de estómago.

Precauciones especiales:

- Informar al médico antes de cualquier intervención quirúrgica.
- En extracciones dentales, seguir las recomendaciones para evitar complicaciones hemorrágicas.

Información para pacientes. Si tiene cualquier duda, contacte con nosotros.